

## **Remédio contra gripe A causa efeitos colaterais em crianças**

### **Ciências**

Enviado por: Visitante

Postado em:05/08/2009

Várias crianças sofreram efeitos neuropsiquiátricos, como falta de concentração, sensação de confusão, pesadelos e "comportamentos estranhos" depois de tomar o Tamiflu, medicamento indicado contra a gripe A.[Imagem: BBC] Efeitos colaterais do Tamiflu Dois estudos divulgados nesta quinta-feira, feitos com crianças britânicas, mostraram que mais da metade das que tomaram Tamiflu, o remédio indicado para prevenção e tratamento da gripe suína, sofreram de efeitos colaterais, como náusea, dores, insônia e até pesadelos. Os estudos foram conduzidos por especialistas da Agência de Proteção de Saúde (HPA, na sigla em inglês) da Grã-Bretanha e publicadas no site da revista científica Eurosurveillance, informou a BBC Brasil. Em um dos estudos, os dados foram levantados em uma escola no sudoeste da Inglaterra. As crianças - de 11 e 12 anos de idade - começaram a tomar a medicação depois que alguns colegas foram diagnosticados com gripe suína. Tamiflu para prevenção Os pesquisadores investigaram dados de 248 crianças que tomaram o remédio apenas para prevenção da doença, em busca dos efeitos colaterais do Tamiflu. "Cinquenta e um por cento tiveram sintomas como náusea (31,2%), dor de cabeça (24,3%) e dor de barriga (21,1%). Apesar de algumas crianças estarem doentes com algum tipo de sintoma parecido com os da gripe, nenhuma estava infectada com o vírus A (H1N1)", diz o estudo. Segundo a pesquisa, 77% das crianças fizeram o tratamento completo com Tamiflu e 91% usaram o remédio por pelo menos sete dias seguidos. Desconforto dos efeitos colaterais Os cientistas disseram que os efeitos pesquisados são comuns e que "o desconforto dos efeitos colaterais precisa ser considerado" pelos pais que dão o Tamiflu para seus filhos como forma de prevenção. Outro estudo do HPA em três escolas de Londres, também publicado no Eurosurveillance, com 103 crianças mostrou que 85 delas tomaram a medicação para se prevenir, depois que um colega de aula foi diagnosticado com a gripe. Uma das escolas chegou a ficar fechada por dez dias. Comportamentos estranhos Dos 85, 45 sofreram pelo menos um dos efeitos colaterais do Tamiflu. Os mais comuns foram náusea (29%), dores estomacais ou câibras (20%) e problemas de sono (12%), como insônia e pesadelos. Dezoito por cento sofreram efeitos neuropsiquiátricos, como falta de concentração, sensação de confusão, pesadelos e "comportamentos estranhos". O estudo foi conduzido em abril e maio, antes de o governo britânico parar de indicar o Tamiflu para prevenção. Atualmente o remédio é usado apenas para tratamento de pessoas já infectadas ou com suspeita. No Brasil o medicamento está com sua distribuição centralizada pelo governo. Fonte: Diário da Saúde - Publicada em 31/07/2009